



GÜCLÜ
YEM

"Kazandırır"



Küçükbaş



1-7 haftalık yaşlar arasındaki damızlık dişi ve erkek kuzuların beslenmesinde kullanıldığı gibi kısa süreli hızlı kuzu besleme döneminin tamamında (1- 14 hafta) kullanılacak, sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici katkıları içeren bir kuzu başlangıç yemidir.

HIZLI KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ	
Temel Besin Maddeleri	
Kuru Madde (en az)	% 88
Ham Protein (en az)	% 18
Ham Selüloz (en çok)	% 6
Ham Kül (en çok)	% 9
Ham Yağ (en az-en çok)	% 3-5
Kalsiyum (en az-en çok)	% 1,2-1,3
Fosfor (en az-en çok)	% 0,6-0,65
Sodyum (en az-en çok)	% 0,1-0,5
Vitamin A (en az)	24000 iu/kg
Vitamin D ₃ (en az)	6000 iu/kg
Vitamin E (en az)	70 mg/kg

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.

Faydaları

- Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile yeni doğan kuzularda süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlar.
- İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
- Özel katkıları ve dengeli rasyon içeriği ile böbrek ve idrar taşı oluşumunu engeller.
- Kuzunun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini ve dayanıklılığını yükseltip yaşama gücünü artırarak kuzu kayıplarını azaltır.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların kısa sürede yeme alışmalarını sağlar.

- Özel formülü sayesinde rumen (işkembe) duvarı (papilla) gelişimini hızlandırır.
- Kuzularda daha kolay ve erken süttan kesime imkan sağlar.
- İşkembenin fonksiyonel ve fiziksel gelişimini hızlandırarak, kuzuların yemden daha iyi yararlanmalarına olanak sağlar. Böylece kuzularda daha ekonomik bir beslemeye imkan sağlayarak işletme kazancını artırır.
- İçeriğinde kuzunun sağlığı için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

- Kuzular doğumu takiben mutlaka ilk yarım saat içinde ağız sütünden (kolostrum) her 1 kg canlı ağırlık için 50 ml alması gerekir. Kuzuların doğum ağırlığı 4-5 kg arasında değiştiği göz önünde tutulursa ilk yarım saat içinde 200-250 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Bunu takip eden 1. günün diğer sürecinde 6-8 öğün ve her öğünde 250 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir.
- Kuzulara 2-5. günlerde 4-6 öğün ve her öğünde 300 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Uygulanan yaygın sistem ise annelerden ağız sütü (kolostrum) salgıladıkları süreç boyunca kuzuları onların yanında tutarak yeterince ağız sütü alımı sağlar.
- Kuzular 5. günden- 3. hafta sonuna kadar annelerini emerler. Bu dönemde koyunlar meraya çıkarılarken kuzular ağılda bırakılır.
- Koyunlar 4. haftadan itibaren sağılmaya başlanır. Meraya giden koyunlar akşam dönüşlerinde önce sağılırlar, sonra kuzuların yanına bırakılırlar. Bu uygulama ile kuzuların günlük anne sütü tüketimi azaltılarak kuru yemlere olan ilgisi artırılır. Böylelikle kuzularda daha iyi bir işkembe gelişimi sayesinde daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
- Kuzuların önünde 5. günden itibaren içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su buldurulmalıdır.
- Herhangi bir ilave yeme gerek duymaksızın **TEK BAŞINA HIZLI KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ**, 5. gün-

- den kesim ağırlığına gelinceye kadarki (14. hafta) dönemde kuzuların önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.
- Kuzuların önüne 3. haftadan sonra serbest olarak yiyebileceği şekilde 1/10 çiçeklenme döneminde hasat edilmiş kuru yonca otu veya iyi kaliteli kuru çayır otu verilmeli. Asla mecbur kalınmadıkça saman gibi kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.
- Çok erken dönemde biçilmiş yonca kuru otu sindirim bozukluklarına ve ishale yol açabilir.
- Kuzular 13-14 haftalık yaşa ulaştıklarında; toplam besi süresinde yaklaşık 50-55 kg HIZLI KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ tüketip canlı ağırlığı ırk ve bakım koşullarına bağlı olarak 38-44 kg'a kadar ulaşır, böylece kuzular kesime gönderilir. Kuzularda 46 kg canlı ağırlıktan sonra kazanılan her kg canlı ağırlık, daha çok iç yağ ve kabuk yağı şeklinde olmaktadır. Bu durum aynı zamanda kesimhanelerde etin kaliteli kuzu eti fiyatından satılmasında sıkıntılar oluşturmaktadır.
- HIZLI KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ, ileride damızlığa ayrılacak dişi ve erkek kuzuların sadece ilk 7 hafta sonuna kadarki beslenmesinde de kullanılır. Daha sonra ki büyütme sürecinde damızlık dişi ve erkek kuzuların beslenmesinde BİRİCİK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ kullanılır.

0-14 Haftalık Kuzular İçin Besleme Programı

Yaş	Ağız Sütü Kolostrum (Gün)	Anne Sütü	Hızlı	Yonca yada Kuru Çayır Otu	Su
Doğumu Takip İlk Yarım Saat İçinde	Her 1 kg Canlı Ağırlık için 50 ml (Yaklaşık 200-250ml)	-	-	-	-
1.Günün Diğer Sürecinde	Her Öğünde 250 ml 6-8 öğünde	-	-	-	-
2-5. Gün	Her Öğünde 300 ml 4-6 öğünde	-	-	-	-
5.Gün- 2.Hafta	-	Anne ile 24 saat beraber Tam Gün Emiş (An-nelerin meraya çıkma süresi hariç)	Serbest	-	Serbest
3.Hafta	-	Anne ile 24 saat beraber Tam Gün Emiş (An-nelerin meraya çıkma süresi hariç)	Serbest	Serbest	Serbest
4-7.Hafta	-	Sadece Akşam Sağım Sonrası Emiş	Serbest	Serbest	Serbest
8-14.Hafta	-	Sadece Akşam Sağım Sonrası Emiş	Serbest	Serbest	Serbest



Kazandırır



1-7 haftalık yaşlar arasındaki kuzuların beslenmesinde kullanılabilen, sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici katkıları içeren bir kuzu başlangıç yemidir.

BİRİCİK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ Temel Besin Maddeleri	
Kuru Madde (en az)	% 88
Ham Protein (en az)	% 17
Ham Selüloz (en çok)	% 12
Ham Kül (en çok)	% 9
Ham Yağ (en az-en çok)	% 3-6
Kalsiyum (en az-en çok)	% 1-1,3
Fosfor (en az-en çok)	% 0,5-0,65
Sodyum (en az-en çok)	% 0,1-0,5
Vitamin A (en az)	18000 iu/kg
Vitamin D3 (en az)	4500 iu/kg
Vitamin E (en az)	52,5 mg/kg

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.

Faydaları

- Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile yeni doğan kuzularda süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlar.
- Özel katkıları ve dengeli rasyon içeriği ile böbrek ve idrar taşı oluşumunu engeller.
- İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
- Kuzunun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini ve dayanıklılığını yükseltip yaşama gücünü artırarak kuzu kayıplarını azaltır.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların kısa sürede yeme alışmalarını sağlar.

- Özel formülü sayesinde rumen (işkembe) duvarı (papilla) gelişimini hızlandırır.
- Kuzularda daha kolay ve erken süttan kesime imkan sağlar.
- İşkembenin fonksiyonel ve fiziksel gelişimini hızlandırarak, kuzuların yemden daha iyi yararlanmalarına olanak sağlar. Böylece kuzularda daha ekonomik bir beslemeye imkan sağlayarak işletme kazancını artırır.
- İçeriğinde kuzunun sağlığı için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

- Kuzular doğumu takiben mutlaka ilk yarım saat içinde ağız sütünden (kolostrum) her 1 kg canlı ağırlık için 50 ml alması gerekir. Kuzuların doğum ağırlığı 4-5 kg arasında değiştiği göz önünde tutulursa ilk yarım saat içinde 200-250 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Bunu takip eden 1. günün diğer sürecinde 6-8 öğün ve her öğünde 250 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir.
- Kuzulara 2-5. günlerde 4-6 öğün ve her öğünde 300 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Uygulanan yaygın sistem ise annelerden ağız sütü (kolostrum) salgıladıkları süreç boyunca kuzuları onların yanında tutarak yeterince ağız sütü alımı sağlanır.

- Kuzular 5. günden- 3. hafta sonuna kadar annelelerini emerler. Bu dönemde koyunlar meraya çıkarılabilirken kuzular ağılda bırakılır.
- Koyunlar 4. haftadan itibaren sağılmaya başlanır. Meraya giden koyunlar akşam dönüşlerinde önce sağılırlar, sonra kuzuların yanına bırakılırlar. Bu uygulama ile kuzuların günlük anne sütü tüketimi azaltılarak kuru yemlere olan ilgisi artırılır. Böylelikle kuzularda daha iyi bir işkembe gelişimi sayesinde daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
- Kuzuların önünde 5. günden itibaren içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundurulmalıdır.
- Herhangi bir ilave yeme gerek duymaksızın **TEK BAŞINA BİRİCİK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ**, 5. günden süttan kesinceye kadarki dönemde (7. hafta) kuzuların önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.
- Kuzuların önüne 2. haftadan sonra serbest olarak yiyebileceği şekilde 1/10 çiçeklenme döneminde hasat edilmiş kuru yonca otu veya iyi kaliteli kuru çayır otu verilmeli. Asla mecbur kalınmadıkça saman gibi kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.
- Çok erken dönemde biçilmiş yonca kuru otu sindirim bozukluklarına ve ishale yol açabilir.
- Kuzular 7 haftalık yaşa ulaştıklarında; günde 300-350 gr **BİRİCİK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ** tüketiyor ve canlı ağırlıkları yaklaşık 12-14 kg arasında ise artık tamamen süttan kesilirler.



0-7 Haftalık Kuzular İçin Besleme Programı

Yaş	Ağız Sütü Kolostrum (Gün)	Anne Sütü	Biricik Bir	Yonca yada Kuru Çayır Otu	Su
Doğumu Takip İlk Yarım Saat İçinde	Her 1 kg Canlı Ağırlık için 50 ml (Yaklaşık 200-250ml)	-	-	-	-
1.Günün Diğer Sürecinde	Her Öğünde 250 ml 6-8 öğünde	-	-	-	-
2-5. Gün	Her Öğünde 300 ml 4-6 öğünde	-	-	-	-
5.Gün- 2.Hafta	-	Anne ile 24 saat beraber Tam Gün Emiş (Annelerin meraya çıkma süresi hariç)	Serbest	-	Serbest
3.Hafta	-	Anne ile 24 saat beraber Tam Gün Emiş (Annelerin meraya çıkma süresi hariç)	Serbest	Serbest	Serbest
4-7.Hafta	-	Sadece Akşam Sağım Sonrası Emiş 300-350 gr Biricik Bir Kuzu Başlangıç yemi tüketiminde süttten kesim yapılır.	Serbest	Serbest	Serbest



Kazandırır



Kuzuların 7 haftalık yaştan, kesim olgunluğuna gelene kadarki beslenmesinde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici katkıları içeren, bir kuzu büyütme yemidir.

BİRİCİK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ Temel Besin Maddeleri	
Kuru Madde (en az)	% 88
Ham Protein (en az)	% 17
Ham Selüloz (en çok)	% 13
Ham Kül (en çok)	% 9
Ham Yağ (en az-en çok)	% 3-6
Kalsiyum (en az-en çok)	% 1-1,3
Fosfor (en az-en çok)	% 0,5-0,65
Sodyum (en az-en çok)	% 0,1-0,5
Vitamin A (en az)	18000 iu/kg
Vitamin D ₃ (en az)	4500 iu/kg
Vitamin E (en az)	52,5 mg/kg

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.

Faydaları

- Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile kuzularda süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlayarak işletmenizin kazancını artırır.
- Kuzularda karkas eti kalitesini ve randımanını artırır.
- Özel katkıları ve dengeli rasyon içeriğiyle, böbrek

- ve idrar taşı oluşumunu engeller.
- İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların kısa sürede yeme alışmalarını sağlar.
- İçeriğinde kuzunun sağlığı için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

- Bir ilave yeme gerek duymaksızın **TEK BAŞINA BİRİCİK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ**'ni 7 haftalık yaştan kesim olgunluğuna kadar kuzuların önünde serbest olarak bulundurulmalıdır.
- Eğer **BİRİCİK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ**' ne yeni başlanıyorsa veya **BİRİCİK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEM**' inden geçiş yapıyorsa kuzular 10 gün içinde kademeli olarak alıştırlarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
- Kuzuların önünde istediği kadar içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundurulmalıdır.
- Kuzuların önünde serbest olarak yiyebileceği şekilde 1/10 çiçeklenme döneminde hasat edilmiş kuru yonca otu veya iyi kaliteli kuru çayır otu verilmeli. Asla mecbur kalınmadıkça saman gibi kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.
- Çok erken dönemde biçilmiş yonca kuru otu sindirim bozukluklarına ve ishale yol açabilir.
- **BİRİCİK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ** ile yaklaşık 100-105 günlük kuzu büyütme dönemi sonunda kuzuların canlı ağırlıkları ırk ve bakım koşullarına göre değişmekle birlikte 38-44 kg'a ulaşır. Bu aşamadan sonra damızlık için ayrılanlar dışında kalan besisine devam edilecek kuzularda **ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ** kullanılmalıdır.



7 Haftalık Yaştan Kesim Olgunluğuna Kadar Besi Kuzularına Uygulanabilecek Besleme Programı

Yaş	Biricik İki	Yonca yada Kuru Çayır Otu	Su
7 Hafta - Kesim	Serbest	Serbest	Serbest



Damızlık için ayrılanlar dışında kalan büyütme dönemi sonrası besiyeye alınmış 7-12 aylık erkek ve dişi kuzuların (tokluların) ve aşım yapan koç ve tekelerin beslenmesinde kullanılacak, sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici katkıları içeren, bir yemdir.

ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ Temel Besin Maddeleri	
Kuru Madde (en az)	% 88
Ham Protein (en az)	% 17
Ham Selüloz (en çok)	% 13
Ham Kül (en çok)	% 9
Ham Yağ (en az-en çok)	% 3-6
Kalsiyum (en az-en çok)	% 1-1,3
Fosfor (en az-en çok)	% 0,5-0,65
Sodyum (en az-en çok)	% 0,1-0,5
Vitamin A (en az)	18000 iu/kg
Vitamin D ₃ (en az)	4500 iu/kg
Vitamin E (en az)	52,5 mg/kg

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.

Faydaları

- Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile toklularda iyi bir semirme ve düşük yağlı kaliteli karkas sağlayarak işletmenizin kazancını artırır.
- Toklu besiciliği, çoğunlukla mera ağırlıklı bölgelerde yapıldığı için mera ile birlikte kullanıldığında hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.
- Özel katkıları ve dengeli rasyon içeriğiyle, böbrek ve idrar taşı oluşumunu engeller.

- İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile tokluların kısa sürede yeme alışmalarını sağlar.
- İçeriğinde toklunun sağlığı için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

- Eğer ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ'ne yeni başlanıyorsa veya başka bir yemden geçiş yapılıyorsa toklular 10 gün içinde kademeli olarak alıştırmak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
- Bir ilave yeme gerek duymaksızın **TEK BAŞINA** ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ yoğun besiyeye alınan toklulara 300 gr kuru ot ile birlikte serbest olarak tüketime sunulabilir. Bu programın dışında öğünlü besleme yapanlar aşağıda verilen tablodaki örnek toklu besiyeme programını da kullanabilirler.
- Tokluların önünde istediği kadar içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundurulmalıdır.

- Beslenmesinde ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ kullanılan toklular yaklaşık bir yaşını geçtikten ve 45-50 kg ağırlığa ulaştıktan sonra besiyeye son verilir. Bu aşamadan sonra besiyeye devam edilecek olursa yüksek oranda yağlı bir karkas elde edilir.
- Koçlara ve tekelere aşımın 3-4 hafta öncesinden başlayıp tüm aşım dönemi süresince vücut kondisyonlarına bağlı olarak günde 500 gr ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ verilerek yapılan flushing uygulaması koçlarda döl verimini artırır.

7-12 Aylık Toklulara Uygulanabilecek Besleme Programı

Canlı Ağırlık (Kg)	Yemler (Gr./Gün)			Su
	Çekici	Kaba Yemler		
		Mera (Orta Kalite 8 Saat Otlatma)	Yonca yada Kuru Çayır Otu	
30	1.0-1.2	-	300-500	Serbest
	0.9-1.1	Serbest	100-200	Serbest
35	1.1-1.2	-	300-500	Serbest
	1.0-1.2	Serbest	100-200	Serbest
40	1.3-1.5	-	300-500	Serbest
	1.2-1.4	Serbest	100-200	Serbest
45	1.4-1.6	-	300-500	Serbest
	1.3-1.5	Serbest	100-200	Serbest
50	1.5-1.7	-	300-500	Serbest
	1.4-1.6	Serbest	100-200	Serbest

Bu program farklı kaba yemlere göre değişik şekilde düzenlenebilir.



Damızlık koyunların farklı dönem (aşım (flushing), erken ve geç gebelik, emzirme ve sağım dönemlerinde) beslemesinde kullanılabilen üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, bir yemdir.

KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ Temel Besin Maddeleri	
Kuru Madde (en az)	% 88
Ham Protein (en az)	% 17
Ham Selüloz (en çok)	% 13
Ham Küllü (en çok)	% 10
Ham Yağ (en az-en çok)	% 3-6
Kalsiyum (en az-en çok)	% 1-1,2
Fosfor (en az-en çok)	% 0,5-0,60
Sodyum (en az-en çok)	% 0,2-0,5
Vitamin A (en az)	18000 iu/kg
Vitamin D3 (en az)	4500 iu/kg
Vitamin E (en az)	52,5 mg/kg

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.

Faydaları

- Dengeli bir protein-enerji yapısı , zengin vitamin ve mineral bileşimi ile kısa sürede hayvanlarınızın süt verimi ve kalitesini, genetik kabiliyeti oranında üst düzeye çıkararak uzun süreli yüksek seviyede süt üretimi sağlar ve işletmenin kazancını artırır.
- Aşım döneminde (flushing) başarılı bir döllenme için gerekli olan sağlam ve sağlıklı vücut yapısını oluşturarak damızlık koyunların kondisyonlarını yükseltir.
- Erken gebe dönemdeki koyunların yağlanmasına sebep olmadan, vücut kondisyonunu dengeleyerek verim döneminde yüksek süt veriminin alınmasına olanak sağlar.
- Kuzu doğum ağırlıklarını artırır ve yılda birden fazla kuzu alımını sağlamada etkilidir.
- Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslemeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir.
- İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

- Eğer KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ' ne yeni başlıyorsanız veya başka bir süt yeminden geçiş yapıyorsanız koyunlar 10 gün içinde kademeli olarak alıştırlarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
- KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
- Koyunlarınızın önüne istediği kadar içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundurulmalıdır.
- Hayvan başına günlük verilecek KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ miktarı koyunun canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen diğer kaba yemlerin kalitesine ve miktarına göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme programını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, GÜÇLÜ YEM Bölge satış Müdürüne veya Yetkili Bayi'mize başvurunuz.



Koç Katım Döneminden Sağım Dönemine Kadar Koyunlara Uygulanabilecek Besleme Programı

Koyunculukta Farklı Dönemler		Yemler (Gr./Gün)				Su
		Kivanç	Kaba Yemler			
			Yonca yada Kuru Çayır Otu	Saman	Mera (Orta Kalite 8 Saat Otlatma)	
AŞIM DÖNEMİ(FLUSHING) (Aşımın 3-4 Hafta öncesinden 2-3 Hafta sonrasına kadar)		200	Serbest	-	Serbest	Serbest
		400	-	Serbest	Serbest	Serbest
ERKEN GEBE DÖNEMİ (Gebeliğin ilk 3.5 Ayı)		150	Serbest	-	Serbest	Serbest
		300	-	Serbest	Serbest	Serbest
GEÇ GEBE DÖNEMİ (DOĞUMA HAZIRLIK DÖNEMİ) (Gebeliğin son 1.5 Ayı)		300	Serbest	-	Serbest	Serbest
		600	-	Serbest	Serbest	Serbest
EMZİRME DÖNEMİ (0-3 Hafta)	1 Kuzulu	800	Serbest	-	Serbest	Serbest
		1200	-	Serbest	Serbest	Serbest
	2 Kuzulu	1400	Serbest	-	Serbest	Serbest
		1800	-	Serbest	Serbest	Serbest
SAĞIM DÖNEMİ Süt (Lt./Gün)	0,5	150	Serbest	-	Serbest	Serbest
		500	-	Serbest	Serbest	Serbest
	1	450	Serbest	-	Serbest	Serbest
		900	-	Serbest	Serbest	Serbest
	1,5	850	Serbest	-	Serbest	Serbest
		1400	-	Serbest	Serbest	Serbest
	2	1350	Serbest	-	Serbest	Serbest
		1800	-	Serbest	Serbest	Serbest

Bu program farklı kaba yemlere göre değişik şekilde düzenlenebilir.

Kazandırır



GÜÇLÜ YEM

Koyun, Kuzu, Tokluların Beslenmesine İlişkin Temel Bilgiler, Tavsiye ve Uygulamalar

- Kuzuların bakım ve beslenmesi öncelikle gebe koyunların bakım ve beslemesi ile başlar. Kuzu ana karnındaki gelişiminin %70'ini gebeliğin son 1.5 ayında tamamlar.
- Gebeliğin son döneminde (doğuma 1.5 ay kala) iyi bakım besleme ile koyunlarda canlı ağırlık artışı ve kondisyon puanında artış, doğum sonrası daha az canlı ağırlık ve kondisyon kaybı, kuzunun doğum ağırlığında artış, sütten kesinceye kadar kuzu kayıplarında azalma, kuzularda yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
- Doğuma çok yakın günlerde fabrika yemi azaltılmalı ve yiyebildiği kadar kaliteli kuru ot verilmelidir. Koyuna doğum yaptığı gün sadece kuru ot verilmelidir.
- Doğuracak koyunlar özel doğum bölmelerine alınır. Bu bölmeler havadar, temiz ve kuru olmalı altına bolca altlık serilmelidir.
- Doğan kuzular temiz havlu ile kurulanıp, burun delikleri ve ağız mukozası temizlenerek rahat nefes alması sağlanmalıdır. Kuzunun göbek kordonu 4 parmak aşağıdan kesildikten sonra tentürdiyotla dezenfekte edilip 2-3 cm'den bağlanmalıdır.
- Koyunlarda kuzulamadan sonra yavru zarının dışarı atılma süresi 0-3 saattir. Yavru zarının atılmasından sonra koyunun döl yatağı 30 gün içerisinde eski durumuna döner.
- Yeni doğan kuzularda vücut sıcaklığının sabit tutulma mekanizması hemen gelişmez. Doğuma müteakip kuzu ve anası soğuk hava akımından korunmalıdır. Bu nedenle doğum yerlerinin mümkün olduğunca sıcak (yaklaşık 20-25 °C) ve korumalı olmasına dikkat edilmelidir.
- Doğumdan sonra mutlaka yapılması gereken en önemli iş, yavrunun ilk yarım saat içinde mikropla temas etmeden, bağışıklık maddelerini içeren yeterli miktarda (1kg canlı ağırlık için 50 ml) ağız sütünü içirmektir. Kuzuyu hastalıklara karşı koruyacak tek kaynak anasının verdiği ağız sütüdür. Bu ağız sütünün yapısı saatler ilerledikçe normal süte dönmeye başladığı gibi yine saatler ilerledikçe bu sütün kuzu barışından emilim yeteneği de azalır. Aynı günün diğer sürecinde her öğünde 250 ml olmak üzere 6-8 öğün daha ağız sütü ile besleme yapılır. Kuzulara 2-5. günlerde 4-6 öğün her öğünde 300 ml ağız sütü içirilmelidir. Uygulanan yaygın sistem ise annelerden ağız sütü salgıladıkları süreç boyunca kuzuları onların yanında tutarak ağız sütü alımı sağlanır. Kuzu doğumu izleyen ilk yarım saat içinde kalkıp anasını emebilmesi gerekir. Anasını ememiyorsa meme başını bulmasına ve emişine yardımcı olunur.
- Doğum sonrası kuzunun anası ölmüş veya ikiz doğum nedeniyle ananın sütü yeterli gelmiyorsa kuzu başka bir koyuna alıştırılır. Yani kuzuya süt ana bulunur veya biberonla elle beslenir.

- Ağız sütü kuzulara bağışıklık maddelerini sağlaması yanında onların ilk 5 günlük tüm temel besin madde ihtiyacını karşılar. Ayrıca içeriğinde bulunan magnezyum sülfat kuzularda hafif bir ishal yaparak, kuzunun anne karnında iken bağırsaklarında biriken dışkı kalıntılarının (mekonyum) kısa sürede dışarı atılmasını sağlar.
- Kuzuların 5. günden itibaren önünde içebileceği devamlı temiz ılık su bulundurulmalıdır.
- Kuzulara 3. haftadan itibaren kaliteli yonca yada kuru çayır otu serbest olarak verilir. Asla mecbur kalınmadıça saman gibi kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.
- Kuzular 5. günden 3. haftanın sonuna kadar anneleri ile beraber kalıp tam gün emiş yaparak hem annelerini emerler hem de önlerine serbest olarak konulmuş KUZU BAŞLANGIÇ yemlerini tüketirler. Bu dönemde yem tüketimi fazla olan ve annelerinden fazla süt içen bazı kuzularda sarı ishal görülebilir. Bu durumda kuzuların annelerinden sağım yapılarak kısmen onların annelerinden içebileceği süt miktarı azaltılarak sindirim bozukluğu problemi ortadan kaldırılır.
- Kuzular 21 günden önce asla sütten kesilmemelidir.
- Kuzularda silaj, şeker pancarı posası, değişik yumru ve kök yemleri 3 haftadan önce kullanılmamalıdır.
- Koyunlar 4. haftadan itibaren mera dönüşü sağlanırlar. Sağım sonrası emiş için kuzuların yanına bırakılır. Bu uygulama ile kuzuların günlük anne sütü tüketimi azaltılarak kuru yemlere olan ilgisi artırılmış olunur.
- Kuzular 7 haftalık yaşa ulaştıklarında; günde 300-350 gr. KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ tüketiyor ve canlı ağırlıkları yaklaşık 12-14 kg arasında ise artık tamamen sütten kesilip analarından ayrılarak ayrı bir bölmeye alınmalı. Önlerine KUZU BÜYÜTME YEMİ konularak 10 gün içerisinde alışmaları sağlanmalıdır. Kuzu anadan ayrılma stresini 2-3 gün içinde atlatacak ve en fazla 1 hafta içerisinde yeni şartlara uyum gösterecektir.
- Kuzular sütten kesimden 1 hafta sonra meraya çıkartılabilir. Kuzu sürülerine meraya çıkmadan önce biraz kuru ot verilerek anaç sürüden ayrı olarak otlatılmalı ve enterotoksemi aşısı yapılmalıdır.
- Sürümüzde yapacağımız gençleştirme oranını tespit ettikten sonra, kendimize damızlık olarak tespit ettiğimiz kuzuları 3-4 ay kadar anadan süt emzirmeye devam ettirmeliyiz. Sütten kesimden sonra erkek ve dişi kuzular ayrı sürüler halinde otlatılırlar. Meraya ilave günlük 200-300 gr. BÜYÜTME YEMİ takviyesi yapılır.
- Uygulanan kuzu besleme programından beklenen canlı ağırlık artışı sonuçlarının gerçekleşmesinde onların buldukları bölmelerin altının temiz, kuru ve bol yataklık serilmiş olması önemli bir faktördür. Bu nedenle kuzu bölmelerinin altı asla ıslak olmamalıdır.

GÜÇLÜ YEM

- Koyun kuzuların idrarları alkali karaktere sahip olmaları nedeniyle idrar taşı oluşumuna müsait durumdadır. Özellikle yoğun yemle yapılan beslemenin 4-5. haftasından itibaren idrar kanalında oluşan bu idrar taşları cinsiyet ayrımı olmadan hem erkek hem de dişi hayvanlarda görülmekle birlikte dişiler erkeklere oranla farklı anatomik yapıda idrar yoluna (erkeklere oranla dişilerde idrar yolları daha kısa ve geniştir) sahip olması nedeniyle bu taşları düşürebilirler. Çok farklı sebeplerden dolayı (rasyonun hatalı mineral yapısı, aşırı protein beslemesi, içme suyu olarak kullanılan mineral oranı çok yüksek olan kireçli artezyen suları, yetersiz su alımı, idrar yolu enfeksiyonları, hayvanlara bol kesif yem verilmesine karşılık kaba yemlerin çok az verilmesi veya hiç kaba yem verilmemesi, yemleme aralıklarının uzun olması, kalsiyuma göre fosforca zengin olduğu bilinen tahılların; saman gibi silikatlar bakımından zengin kötü kaliteli kaba yemlerin; okzalatlardan zengin pancar yaprağı ve erken biçilmiş yoncanın; östrojenik mera otları ve yem bitkilerinin çok yüksek miktarda ve uzun süre yedirilmesi, A vitamini noksanlığı) oluşan idrar taşları genellikle erkek hayvanların idrar yolunu tıkayarak idrar yapımını engeller ve ölüme sebep olur. Firmamız üretmiş olduğu yemlerde böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici özel katkıları mevcuttur. Bu fabrika yemlerinin **TEK BAŞINA** kaliteli kaba yemlerle birlikte serbest olarak hayvanlara yedirilmesi durumunda üreticinin en önemli sorunlarından birisi olan ve halk arasında “sidik zoru” veya “işeme zorluğu” olarak adlandırılan Ürolithiasis probleminin ortaya çıkması engellenir.
- KUZU BÜYÜTME YEMİ ile yaklaşık 100-105 günlük kuzu büyütme dönemini sonunda kuzuların canlı ağırlıkları ırk ve bakım koşullarına göre değişmekle birlikte 38-44 kg'a ulaşır. Bu aşamadan sonra damızlık için ayrılanlar dışında kalan kuzularda ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ kullanılmalıdır.
- Erkek kuzular aynı yemi yedikleri halde dişi kuzulardan daha çok et tutarlar. Erkeklerin besi kabiliyeti daha yüksektir. Onun için erkek kuzular beside daha iyi sonuç verir.
- Kuzularda 45-50 kg canlı ağırlıktan sonra kazanılan her kg canlı ağırlık, daha çok iç yağ ve deri altı kabuk yağ şeklinde olmaktadır. Bu durum, aynı zamanda kesimhanelerde etin kaliteli kuzu eti fiyatından satılmasında sıkıntılar oluşturmaktadır.
- ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ, genelde yoğun kuzu besisine uygun şartların olmadığı mera ağırlıklı koyunculuk yapılan bölgelerde ilave 100-200 gr kuru ot ile birlikte; meranın olmadığı ağılda yapılan toklu besisinde ise 300 gr kuru ot ile birlikte toklulara serbest olarak verilir.
- Koyunlarda gereksinimlerin en fazla olduğu koç katımı (flushing) dönemi, geç gebe dönemi (doğuma hazırlık dönemi), emzirme ve sağım dönem-

lerinde yüksek değerli otlarla, gereksinimin en az olduğu erken gebe döneminde (gebeliğin ilk 3.5 ayında) düşük besin değerli kaba yemlerle beslenmelidir.

- Koyunlarda yüksek döl verimi elde etmek (ikizlik oranını artırmak), kısırılığı en aza indirmek için aşımın 3-4 hafta öncesinden 2-3 hafta sonrasına kadar koç katımı (flushing) döneminde koyunların ve koçların besin madde alımlarını artırma ve dolayısıyla vücut ağırlıklarını, kondisyonlarını ve anne karnındaki embriyonun yaşama oranını yükseltmek için bir program dahilinde yem verilir.

- Koçlar işletmenin kuzu verimini tayin eden en önemli unsurdur. Koç katımı döneminde sürüye katılan koçun iyi aşım yapabilmesi, o koçun çok iyi beslenmesine bağlıdır. Şunu asla unutmamalıyız ki aşırı besleme, iyi bir besleme değildir. Aşırı besleme, koçların yağlanmasına neden olur, aşım kabiliyetini azaltır ve sperma kalitesini düşürür. Yetersiz besleme de koçların döl verimlerini olumsuz yönde etkiler.

- Koç katımı (flushing) döneminde koyunlara mera ile birlikte verilen kuru kaba yemin kalitesine göre günlük 200-400 gr KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ; koçlara ve tekelere ise günlük 500 gr ÇEKİCİ TOKLU BESİ YEMİ verilir.

- Koyunlarda erken gebelik döneminde (gebeliğin ilk 3,5 ayı) besleme düzeyi azaltılır. Çünkü bu dönemde embriyo henüz küçük ve büyüme hızı yavaş olduğu için koyunun besin madde gereksinimleri azdır. Bu dönemde koyunlar meradan tam yararlanmadığı ya da mera kalitesi iyi olmadığı taktirde verilen diğer kuru kaba yemin kalitesine göre KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ'nden 150-300 gr arasında verilerek, günlük ortalama 30-40 gr canlı ağırlık kazanmaları sağlanmalıdır. Bu dönemde koyunların aşırı kilo kazanıp yağlanmaları son derece sakıncalıdır.

- Koyunlarda doğuma hazırlık dönemi (gebeliğin son 1.5 ayı) embriyonun ana karnında en hızlı büyüdüğü ve koyunda meme gelişiminin gerçekleştiği dönemdir. Kuzu doğum ağırlığının üçte ikisini bu dönemde kazanır. Gebe koyunlar bu dönemde günde ortalama 130-180 gr. İkiz kuzu taşıyanların 160-225 gr ağırlık artışı kazanması için meraya ilave kuru kaba yemin kalitesine göre 300-600 gr KIVANÇ KOYUN SÜT YEMİ verilir.

- Koyunlarda 16 haftalık sağım döneminin ilk ayında toplam süt üretiminin %45-50'i üretilir, daha sonra süt üretimi düzenli bir azalma gösterir. İlk bir ay meraya ilave kuru kaba yemin kalitesine, emzirdiği kuzu sayısına ve süt verimine göre verilen KIVANÇ KOYUN SÜT destekleme yemi yavaş yavaş azaltılarak süttten çıkışa kadar verilir.

Kazandırır

Küçükbaş Yemi



Laboratuvar & Ar-Ge


GÜÇLÜ
YEM

“Kazandırır”

Yetkili Bayi Kaşe;



www.inovatif.co

www.gucluyem.com

Paşaalanı Mh. Balıkesir-Bursa Yolu Cd.
No:216/1 Karesi / BALIKESİR
Tel: +90 266 **246 14 50** (pbx)
Fax: +90 266 **246 41 45**

